

## **Consentimento Informado Endoscopia**

### **Termo de Consentimento de Endoscopia**

Paciente: \_\_\_\_\_

Acompanhante / Responsável: \_\_\_\_\_

Médico Examinador:

O presente termo de consentimento tem como objetivo a autorização para a realização de endoscopia digestiva alta. Este exame consiste na visualização do esôfago, estômago e duodeno por meio de uma microcâmera, permitindo um diagnóstico preciso e detalhado das eventuais alterações ou lesões. Quando necessário, a endoscopia inclui a realização de biópsia ou ressecção de pólipos e o material colhido segue para a análise anatomopatológica. O exame dura em média 15 minutos, incluindo o preparo. Após a endoscopia, é necessário permanecer por no mínimo 20 minutos na Clínica Cemexx.

Após o exame o paciente deve ficar repousando na Clínica Cemexx até que se sinta perfeitamente bem e deve sair acompanhado por um adulto responsável. Após a cessação do efeito da anestesia na garganta (cerca de 20 minutos após o término do exame), podem-se ingerir alimentos leves e mornos.

Além disso, devido ao uso de sedativo, não é possível dirigir automóveis ou outros veículos durante o dia todo após a realização da endoscopia. Durante um período de aproximadamente oito horas depois do exame, não realizar tarefas que necessitem de atenção, tais como mexer com máquinas e objetos cortantes. Recomenda-se que o indivíduo faça repouso no restante do dia, alimentando-se com dieta leve e evitando bebidas alcoólicas.

A medicação usada na sedação pode ocasionar um curto período de amnésia e quando realizadas biópsias durante a endoscopia, existe a possibilidade de sentir um leve desconforto, que, contudo é passageiro.

A endoscopia digestiva alta é um exame seguro, no entanto como todo ato médico ela não é isenta de riscos. A complicação mais freqüente é flebite (dor e inchaço no trajeto da veia puncionada) que pode acontecer em até 5% dos casos, dependendo da medicação utilizada para sedação. Complicações mais sérias são muito raras, ocorrendo em menos de 0,2% dos casos, podendo estas relacionadas ao emprego de medicamentos sedativos ou ao próprio procedimento endoscópico. As medicações utilizadas na anestesia / sedação podem provocar reações locais (flebite no local da punção venosa) e sistêmicas de natureza cardiorrespiratória. Caso você tenha alguma doença cardíaca ou pulmonar, um anestesista pode ser contactado para acompanhar a realização do seu exame. Outras complicações da endoscopia digestiva alta, tais como perfurações e sangramentos são excepcionais em exames de diagnóstico, podendo ocorrer em exames terapêuticos, como retirada de corpo estranho (espinha de peixe, ossos) dilatação de estenoses (estreitamentos), ligadura elástica ou esclerose de varizes e retirada de pólipos (polipectomia) ou de lesões planas ou deprimidas (mucosectomia).

Curitiba, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_  
Paciente – Assinatura

\_\_\_\_\_  
Acompanhante-Assinatura

